N°. 67

Lüe 1°.
Lue 2°.
ff

Observation sur une hernie ventrale d'un volume tres considerable, avec etranglement d'une portion de l'estomac

je fus mandai le vingt sept septembre dernier a dix heure et demi du soir, pour voir une dame agée d'environ soixante et quelques années, de la taille de cinq pieds quelques pouces, et ajant beaucoup d'embonpoint: je lui trouvai le pouls si petit qu'a peine on pouvoit le sentir; elle avoit un leger etouffement, les extremités avoit perdu presque leur chaleur naturelle, et toute l'habitude du corps etoit couverte d'une sueur froide. je portai ma main sur le bas ventre, je trouvai une tumeur d'un volume prodigieuse, m'etant informai du tems qu'elle la portoit, la malade me dit qu'il y avoit plus de trente ans, qu'elle avoit pris naissance a la suite d'une couche, et qu'elle avoit grossi peu a peu, que cette tumeur ne lui avoit jamais causé aucune incommodité, que l'embarras de son volume, qu'elle ne sentoit pas meme alors aucune douleur, dans quelqu'unes des partie du bas ventre, qu'elle avoit seulement un penchant presque invincible au sommeil, mais que l'etouffement l'empechoit de si livrer. m'etant informai du tems qu'elle etoit dans l'etat ou je la vojois, et de ce qui avoit precedé

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
ARC 15
d. 65

dans le jour ; elle me dit ainsi que sa domestique, quelle avoit diné a une heure, quelle avoit mangé beaucoup de legumes, quà cinq heures elle avoit eu une legere envie de vomir, et quà huit la difficulté de respirer avoit commencé, accompagnée de petits frissons irreguliers, et dun accablement universel. en reflechissant sur ce qui avoit precedé cette maladie ; sur lespece dalimens, sur la nature des accidens, et le volume enorme de la tumeur, toutes ces considerations me firent apprehender quelque etranglement avec gangrene, et une mort prochaine. dans un etat aussi desesperé, jay crû ne pouvoir mieux faire que de ranimer ses forces en lui faisant prendre une potion cordiale. on profita de cet intervalle de tems pour ladministrer, et elle mourut a une heure du matin. la figure de cette tumeur, son volume extraordinaire et une mort aussi promptes, et le desir que javoit den connoitre la cause sil etoit possible, firent que je demandai louverture de son cadavre, on me laccorda, ce que je fis en presence de monsieur jean mon confrere, elle prenoit naissance environ un pouce au dessous du cartilage xiphoide, setendoit inferieurement deux pouces au dessous de lombilic, et occupoit lateralement les deux regions hipocondriaques. la figure de cette tumeur etoit presque ronde dans lendroit quon pourroit nommer sa base, mais le centre de cette tumeur prenoit une figure conoide, et se prolongoit en

dirigeant sa pointe vers le penil. je pris les dimensions de cette tumeur avant d'en faire l'ouverture, et je trouvai qu'elle avoit vingt deux pouces depuis la partie superieure jusques a cett espece de cone, et celui cy avoit cinq pouces de long, sur quatorse de circonference. comme sa Grosse, ainsi que je viens de le dire s'etendoit sur les regions hipocondriaques, elle avoit trente pouces de distance d'un coté a l'autre. j'observai que l'ombilic etoit plus gros qu'a l'ordinaire, et formoit une cavité de deux pouces de profondeur. j'ouvris ensuite la tumeur, j'observai 1° que l'epaisseur, de la peau, et celle du peritoine etoit extremement mince puisque les deux parties ensemble n'excedoit pas une demi lignes, tant dans le centre que vers sa pointe. 2° je trouvai dans le sac herniaire, le mesentere, la plus grande partie du colon, et les intestins greles. 3° l'interieur du sacq etoit assez uni, sa partie posterieure choisissoit un espece de plancher, qui etoit formé par les muscles de l'abdomen, j'observai a sa partie superieure une ouverture de figure ovale. 4° les muscles du Gros ventre etoient si contractes sur eux memes surtout vers les regions ombilicales, et hipogastriques, qu'a peine ma main pouvoit y etre introduite, 5° les

Cavités ne laissent que des legeres traces de leur existence. 5.° la partie du plancher qui se trouvoit au dessus du trou etoit un peu voutée, sous lequel etoient les visceres qui sont dans cette region.

6.° cette ouverture avoit trois pouces de diametre et etoit située a deux pouces de distance du cartilage xiphoide + sur la ligne blanche + dans laquelle une partie du jejunum et une du colon passent, sans y avoir aucune adherence, et dans l'angle droit de cette ouverture, il y passoit une portion du fond de l'estomac, du volume d'une petite poire, qui s'appuyoit sur le plancher dont j'ay parlé, cette portion du ventricule etoit remplie, par des feves d'haricots, et par des noix qu'elle avoit mangé, elle etoit tellement gangrenée, qu'au moindre attouchement se dechira, et les alimens en sortirent.

7.° quand a l'etat des intestins ils etoient assez bien excepté quelques taches livides qu'on voyoit ça et la; le colon seul avoit contracté quelques adherences par des concretions limphatiques a la partie laterale gauche du foie. a l'egard de l'epiploon il n'en restoit aucun vestige il etoit totalement detruit.

je sçai que la hernie ventrale n'est pas une maladie rare, ce n'est point dans cette vüe que je la presente a l'academie, puisque

plusieurs auteurs celebres en ont donné la
description, celle qui fait le sujet de mon
observation ma paru accompagnée de circonstances
si particulieres, et consequemment differentes de
celles qui ont eté decrites en plusieurs points,
que les considerations mont porté a penser quelle
pourroit meriter lattention de lacademie.

je ferai remarquer en premier lieu quelle a porté
cette hernie un si long espace de tems, sans etre
incommodée, quoiquelle ne se fut jamais servie
daucun brandage fait par un artiste; elle soutenoit
cette enorme tumeur avec un brandage de
corps, figuré a letat des parties, et elle navoit
point des douleurs de coliques qui sont si frequentes
dans cette maladie. secondement elle avoit un
ecoulement periodique sanguin, qui se faisoit par
le milieu de lombilic. on a lieu de presumer
que cette evaluation provenoit de la pression
considerable de quelques vaisseaux. troisiemement
on conçoit difficilement, comment une grande portion
de lestomac, qui etoit engagé dans le sac; ce

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

viscere pouvoit faire ses fonctions. quatriemement il paroit surprenant que la gangrene, se soit fixée en si peu de tems, dans cette partie, sans aucun simptome aparent. Cinquiemement j'observai que les muscles epigastriques, etoient tellement contractés sur eux memes, que la cavité abdominale, n'avoit pas la moitié de son volume ordinaire, d'ou l'on peut conclure que si l'on eust voulu tenter la reduction de cette tumeur, quoiqu'elle n'eust pas d'etranglement, que cette reduction auroit ete impraticable. Siziemement enfin puisque la chirurgie ne nous fournit aucun moyen, pour guerir cette maladie, qu'on appelle eventration; nos vües doivent se tourner du coté de ceux qui en sont affligés; afin d'empecher s'il est possible, l'accident qui a donné lieu a la mort de cette fille; c'est principalement comme l'on sçait, en ne faisant usage que d'alimens convenables a cet etat, et pris en petite quantité a la fois; alors les matieres chileuses, n'etant ny trop epaisses ny trop abondantes, passeront, et repasseront avec plus de facilité, dans ces especes de filiere, et par la elles seront moins susceptibles de causer d'etranglement. Car il est bon d'observer que dans celles que je viens de decrire, ce ne sont point les rebords

de cette ouverture, qui ont causé immédiatement l'étranglement, puisqu'ils n'avoient pas de ressort; mais c'est la distension des colonnes intestinales, qui en se entre-comprimant ont incarcéré cette portion de l'estomac qui vraisemblablement etoit souvent flotante a cette ouverture, surtout lorsque le viscère etoit plein. a ces moyens que je viens d'indiquer, on doit y joindre des auxiliaires pour concourir au meme but; tels que sont la moderation dans les passions, dans les exercices, et surtout se munir de bons bandages convenables; car c'est faute de s'en etre servi dans l'origine de ces tumeurs qu'elles deviennent si monstreuses. Fouquet

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE